ESTUDES 2014/2015

Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Madrid, 11 de Febrero de 2016 💉



Características de la muestra

Antecedentes:

 Desde 1994, el Plan Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España (ESTUDES)

Muestra:

 En 2014/15: 37.486 estudiantes de 941 centros educativos públicos y privados y 1.858 aulas

Objetivos:

- Conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas, los patrones de consumo, los factores asociados y las opiniones y actitudes ante las drogas de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años
- Orientar el desarrollo y evaluación de <u>intervenciones</u> destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados

Distribución de la muestra CCAA

	Núi	mero de alum	nos		
CCAA	PNSD	Ampliación	Tamaño final		
Andalucía	2.572	2.064	4.636		
Aragón	945	1.765	2.710		
Asturias	611	1.279	1.890		
Baleares	859	0	859		
Canarias	1.116	2.476	3.592		
Cantabria	511	1.374	1.885		
Castilla La Mancha	1.079	862	1.941		
Castilla y León	1.183	1.101	2.284		
Cataluña	2.510	0	2.510		
C. Valenciana	1.811	1.449	3.260		
Extremadura	905	0	905		
Galicia	1.328	774	2.102		
Madrid	2.232	2.172	4.404		
Murcia	1.085	0	1.085		
Navarra	662	0	662		
País Vasco	1.164	0	1.164		
La Rioja	507	0	507		
Ceuta	224	0	224		
Melilla	254	612	866		
Total España	21.558	15.928	37.486		




CCAA y CA que han ampliado muestra

Evolución tamaño de muestra

Fortalezas ESTUDES:


- Amplia muestra
- Serie histórica periódica y dilatada 4. Comparabilidad internacional
- 3. Flexibilidad: Módulos específicos




Proporción consumidores drogas

Últimos 12 meses





- En esta encuesta se han analizado 18 sustancias psicoactivas
- Los resultados obtenidos reflejan una mejora considerable de la situación de los consumos de drogas con respecto a ediciones anteriores




Proporción consumidores drogas










Tabaco

Cannabis


- El consumo de todas las drogas ilegales está más extendido entre los hombres que entre las mujeres
- El consumo de **drogas legales** como tabaco, alcohol o hipnosedantes está más extendido entre las **mujeres**



Alcohol

Consumo de tabaco





Consumo de bebidas alcohólicas




Prevalencias elevadas. Tendencia estable. Descenso consumo intensivo

En el último año han iniciado el consumo de alcohol 285.700 estudiantes de 14-18 a.

131.100

Prevalencia (%)

154.600




0											
O	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
—Alguna vez en la vida	84,1	84,2	86	78	76,6	82	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9
Últimos 12 meses	82,7	82,4	83,8	77,3	75,6	81	74,9	72,9	73,6	81,9	76,8
—Últimos 30 días	75,1	66,7	68,1	60,2	56	65,6	58	58,5	63	74,0	68,2
Borracheras últimos 30 días	16,1	15,3	16,5	21,7	20,2	28	25,6	29,1	35,6	30,8	22,2
Binge drinking últimos 30 días								41,4	36,7	41,8	32,2

Consumo de bebidas alcohólicas





Modo conseguir bebidas alcohólicas (menores 14 a 17 años) últimos 30 días (%)



Prevalencia (%)

Consumo de riesgo de alcohol

17 años

18 años


años

16

años

15





17 años

16 años

años

14 años

Hombres

Mujeres

18 años

Hombres

Mujeres


14 años

Total

Consumo de hipnosedantes*



- Cambio de tendencia (creciente desde 1994 hasta 2012)
- El porcentaje de mujeres que consume hipnosedantes en el último año duplica el porcentaje de hombres consumidores (13,8 % frente a 7,7 %). Las diferencias aumentan con la edad




^{*} Con y sin receta

Consumo de hipnosedantes sin receta



- Tendencia descendiente desde 2010
- El porcentaje de mujeres que consume hipnosedantes sin receta en el último año duplica el porcentaje de hombres consumidores (6,8 % frente a 3,8 %). Las diferencias aumentan con la edad



0											
0	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
—Alguna vez en la vida	6,1	6,1	6,4	6,9	6,5	7	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8
—Últimos 12 meses	4,4	4,5	4,7	5	4,5	4,7	4,8	5,7	5,6	5,8	5,3
—Últimos 30 días	2,6	2,2	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,9	3	3,4	3,0

Consumo de cannabis



- Las prevalencias de consumo de cannabis muestran una tendencia descendente
- En el último año empezaron a consumir cannabis 146.200 estudiantes de 14-18 años
- Los hombres consumen en mayor proporción que las mujeres en todos los grupos de edad

Características del consumo (últimos 30 días) 65,6% principalmente marihuana




25,4% de los 2 tipos

86,5% mezclan cannabis y tabaco

Media de porros consumidos al día

3,2



5	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
——Alguna vez en la vida	20,9	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1
Últimos 12 meses	18,2	23,4	25,7	28,8	32,8	36,6	29,8	30,5	26,4	26,6	25,4
Últimos 30 días	12,4	15,7	17,2	20,8	22,5	25,1	20,1	20,1	17,2	16,1	18,6

Consumo problemático cannabis



- El consumo problemático de cannabis está más extendido entre los varones
- El consumo problemático de cannabis aumenta con la edad (7,9% de 14 años, 18,2% de 18 años)
- Hay mayor proporción de consumidores de hachís que entre los no problemáticos, lo mezclan más

con tabaco y fuman más porros al día


Características del consumo problemático (últimos 30 días)



47,7% principalmente marihuana




9,5% principalmente hachís



93,4% mezclan cannabis y tabaco

Media de porros consumidos al día

5,2



■% entre los estudiantes 14-18 años que han consumido cannabis en el último año


■% entre todos los estudiantes de 14-18 años

Consumo de cocaína



Prevalencia (%)

- Las prevalencias de consumo de cocaína muestran una tendencia estable
- Los hombres consumen en mayor proporción que las mujeres en todos los grupos de edad




	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014
—Alguna vez en la vida	2,5	3,4	5,4	6,5	7,7	9	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5
—Últimos 12 meses	1,8	2,7	4,5	4,8	6,2	7,2	4,1	3,6	2,6	2,5	2,8
—Últimos 30 días	1,1	1,6	2,5	2,5	3,2	3,8	2,3	2	1,5	1,5	1,8

Alucinógenos, éxtasis, anfetaminas, inhalables volátiles y heroína*



- Se consolida la tendencia descendente de todas las sustancias ambos sexos.
- Valores más bajos desde el comienzo de la serie de encuestas para alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles.



*Consumo de cada sustancia en los últimos 12 meses




Nuevas Sustancias Psicoactivas



- En esta encuesta el 4% de los estudiantes han consumido NSP alguna vez en la vida
- El 53,7% nunca ha oído hablar de las NSP





Perfil consumidores NSP Consumo experimental de NSP





Alta percepción de disponibilidad en consumidores




Consumidor de sustancias legales e ilegales.

Riesgo percibido



- El alcohol es la sustancia que se percibe como menos peligrosa
- Persiste (desde 2010) la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis
- Mayor riesgo percibido (para el consumo habitual) por mujeres que por hombres

Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que opinan que consumir cada una de las siguientes sustancias (al menos una vez por semana) puede producir muchos o bastantes problemas.




Disponibilidad percibida



Desde 2010 disminuye la disponibilidad percibida para todas las drogas excepto para el alcohol


Porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que conseguir cada una de las siguientes sustancias es muy fácil o relativamente fácil



Acciones contra las drogas

Para los jóvenes, las medidas de mayor eficacia para resolver el problema de las drogas son:
 Educación en las escuelas, tratamiento voluntario a los consumidores, control policial y aduanero y campañas publicitarias

Porcentaje de estudiantes que piensa que cada acción para intentar resolver el problema de las drogas ilegales es algo o muy importante Legalización del cannabis y consumo cannabis últimos 12 meses



	Nada importante	Algo o muy importante	NS/NC
No consumen cannabis			
	31,3	34,5	34,3
Consumidores problemáticos			
	12,8	73,3	14,0